

¿Cuándo tengo que aplicarme la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19?

¿Cuál fue la vacuna que recibió?

Pfizer

Moderna

Johnson & Johnson

¿Cuántos años tiene (usted o su niño)?

¿Hace cuánto tiempo se aplicó usted/su niño una segunda dosis?

¿Hace cuánto que se vacunó?

De 5 a 11 años

mayor de 12 años

Hace menos de 5 meses

Hace menos de 2 meses

Hace más de 2 meses.

¿Su niño tiene inmunocompromiso moderado o grave?

¿Hace cuánto tiempo se aplicó usted/su niño una segunda dosis?

Hace más de 5 meses

Para ponerse al día con las vacunas COVID-19, deberá aplicarse otra dosis lo antes posible. Se recomienda aplicarse las vacunas Pfizer o Moderna.

Si

No

Hace menos de 5 meses

Su niño debe recibir una tercera dosis de Pfizer 21 días (cuatro semanas) después de su segunda dosis.

Hasta nuevo aviso, su niño no necesita una tercer dosis.

No necesita otra dosis hasta nuevo aviso. De todas formas, le recomendamos que pida cita con antelación cuando le corresponda aplicarse una tercera dosis.

Si tiene alergia a algún componente de las vacunas de Pfizer y Moderna (o no puede aplicárselas por otro motivo), debe recibir una dosis de Johnson & Johnson.

Si tiene inmunocompromiso y se aplicó tres dosis de Pfizer o Moderna, debe recibir una cuarta dosis 5 meses después de la tercera.



COLORADO
Department of Public Health & Environment